

KTS® FLOT

**Specifická kombinace nealergenních čířících prostředků
rostlinného původu pro optimální flotaci moštů**

VLASTNOSTI

K vydařené sedimentaci moštu flotací, je nutné mít čířící přísady, které pomohou rychlé flokulaci a dobré separační fázi, a to i v přítomnosti vysokého obsahu (koncentrace) pevných látek. Až dosud pouze želatina kombinovaná s silica gelem a/nebo bentonitem umožňovala tuto úroveň odkalení. Nicméně použití výrobku, který je alergenní anebo živočišného původu se však pro vinaře stává stále problematičtější.

Proto se MARTIN VIALATTE, průkopník rostlinných čířících prostředků, v posledních několika letech věnoval čas vývoji a dosažení alternativních řešení, **KTS® FLOT** vysoce účinný nealergenní product rostlinného původu.

KTS® FLOT lze také použít pro flotaci bílých, růžových a červených moštů vzniklých termovinifikací.

OENOLOGICKÉ VLASTNOSTI


KTS® FLOT umožňuje:

- Rychlé a důkladné odkalení: optimalizace poměru NTU/času
- Urovnání nádob s moštem k usnadnění sedimentace a úspory moštu

KTS® FLOT pomáhá:

- Ochrana proti oxidaci: kontrola barvy a snížení OD420 (žlutá barvy) a OD320 (quinones)
- zlepšit chuť: mošty jsou popisovány jako ovocné, svěží a jemné.

PROCES FLOTACE



Caption :  Must deposit  Protein fining agents  Air or nitrogen

POUŽITÍ

Mošt by měl být vždy před flotací depektizován.

Pektolytický enzymový přípravek doporučený pro tuto fázi je:

- **VIAZYM FLOT** v dávce 2 až 4 mL/hL

Doporučuje se provést pektinový test před flotací v nádrži, aby se ověřilo (depektinace) odbourávání moštu.

KTS® FLOT je tekutý výrobek a může být přímo přidán do moštu k jeho flotaci.

DÁVKOVÁNÍ

Doporučená dávka:

Od 5 do 15 cL/hL v závislosti na kvalitě moštu.

Maximální zákonná dávka podle současných evropských předpisů: 60 cL/hL

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím obsah balení **KTS® FLOT** řádně protřepejte.

Důkladně zamíchejte, tak aby byl mošt promíchán ještě před fází flotace.

Opatření pro použití:

Výrobek je určen pouze pro profesionální enologické použití.

Použití podle platných předpisů.

BALENÍ

20L

SKLADOVÁNÍ

Neotevřené skladujte na suchém místě bez zápachu. Chraňte před mrazem.

Po otevření spotřebujte do 48 hodin.

Poskytnuté informace odpovídají našim současným znalostem. Je poskytována bez závazku nebo záruky, protože podmínky použití jsou mimo naši kontrolu. Opravňuje uživatele k dodržování platných právních předpisů a bezpečnostních předpisů. Tento dokument je vlastnictvím společnosti SOFRALAB a nelze jej bez oprávnění měnit.