

ROZPOUŠŤIDLO VINNÉHO KAMENE P		! . výrobku: 40 62 00
Oblast použití	Rozpouštědlo vinného kamene P je prádkový, vysoce alkalický ! isticí koncentrát s regulovaným pHním k odstraní vinného kamene v nádrích vinařského průmyslu. Rozpouštědlo vinného kamene P odstraňuje pš jednom použití rovně odolné usazeniny plísní, zbytky po králení, želatinu a kvasinky. Rozpouštědlo vinného kamene P se používá speciálně v potravinářských tancích z uglechtilé oceli, plastu odolného proti zásadám a také v nádrích s obkladem ze sklených desek nebo cementu.	
Pokyny k použití	1. Pšmé vyplnění 0,5 ě 0,6 %, pš silnějším nánosu až 1 %. Doba působení by měla ! init 2 ě 4 dny. Následně dtkladně vystškejte nádrž silným proudem vody. 2. Pš! erpání nebo postup CIP 3 ě 7 %, pš době pš! erpání 30 ě 60 minut pš! erpejte pšs rozprařovací hlavu postupem nízkotlakým nebo vysokotlakým. Následně dtkladně vystškejte nádrž silným proudem vody. Podle stupně zne! iění lze ! isticí roztok po pšdání dalšího rozpouštědla použít i na další nádrě. K odstraní zbytkové alkality doporu! ujeme následně opláchnout pasívalním prostředkem S. Pozor: Rozpouštědlo vinného kamene pšed použitím dobře rozpustě ve studené vodě!	
	Po použití dtkladně opláchněte pitnou vodou k odstraní zbytků!	
Snágelivost materiálu	PVDF, PP, PE, PVC, uglechtilá ocel, ocel, ědá litina, sklo Pozor: Rozpouštědlo vinného kamene P nelze používat pro dřevěné sudy nebo materiály jako jsou hliník a jeho slitiny, ani pro pozinkované materiály. Kromě toho nelze zcela vylou! it nesnágelivost na další materiály. Proto pšed použitím proveďte zkoušku na neškodném místě.	

Stanovení koncentrace	Viz titrační předpis		
Fyzikální a chemické vlastnosti			
Vzhled/barva	Bílá		
Podoba	Práček		
Zápach	Bez zápachu		
Prohledání (za aplikačních podmínek)	Nepřehledné		
Fosfáty	Žádné		
Hustota (20°C) g/l	1050,0 ÷ 1200,0		
Koncentrace	1% v destil. H ₂ O	3% v destil. H ₂ O	5% v destil. H ₂ O
Hodnota pH (1%, 20°C)	12,5 ÷ 13,1	odpadá	odpadá
Vodivost (1%, 20°C) mS/cm	46,0 ÷ 52,0	120,0 ÷ 135,0	195,0 ÷ 215,0
Hodnota p (ml)	12,0 ± 1,0 (1 % p ₀ první dávce 5 ml)		
Hodnota m (ml)	Odpadá		
Stálost p ₀ uskladnění	+ 20°C do + 40°C		
Upozornění na biocidy	Odpadá		
Nebezpečné látky a výstražné symboly	Hydroxid sodný Dinatriumtrioxosilicat-Pentahydrát  C - ĽÍRAVINA		
Zvláštní pokyny	Nádobu vždy zavírejte originálním uzávěrem a skladujte v chladu a bez oslunění. Nikdy nevraťte již odebraný produkt zpět do nádoby. Před použitím bezpodmínečně dodržujte pokyny našeho bezpečnostního listu!		
Odstranění odpadu	Odstranění odpadu proveďte dle úředních podmínek, p ₀ se obraťte na výrobce.		

Pokyny o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování viz naše bezpečnostní listy a náš provozní návod. Údaje tohoto technického listu odpovídají dnešnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností. Tyto údaje nepředstavují žádnou záruku, ale jsou nezávazné a jen orientační. Nezaručujeme žádné vlastnosti ani vhodnost pro určité účely použití. Z důvodu velkého množství možných vlivů při používání našich výrobků tyto údaje nezpracováváme. Účivatele povinnosti provedení zkoušek a příslušných preventivních opatření. Případně existující ochranná práva je nutno zohlednit.