

ROZPOUŠTĚDLO VINNÉHO KAMENE P		č. výrobku: 40 62 00
Oblast použití	Rozpouštědlo vinného kamene P je práškový, vysoce alkalický čisticí koncentrát s regulovaným pěněním k odstranění vinného kamene v nádržích vinařského průmyslu. Rozpouštědlo vinného kamene P odstraňuje při jednom použití rovněž odolné usazeniny plísní, zbytky po krášení, želatinu a kvasinky. Rozpouštědlo vinného kamene P se používá speciálně v potravinářských tancích z ušlechtilé oceli, plastu odolného proti zásadám a také v nádržích s obkladem ze skleněných desek nebo cementu.	
	Pokyny k použití 1. Přímé vyplnění 0,5 – 0,6 %, při silnějším nánosu až 1 %. Doba působení by měla činit 2 – 4 dny. Následně důkladně vystříkejte nádrž silným proudem vody. 2. Přecherpání nebo postup CIP 3 – 7 %, při době přecherpání 30 – 60 minut přečerpejte přes rozprašovací hlavu postupem nízkotlakým nebo vysokotlakým. Následně důkladně vystříkejte nádrž silným proudem vody. Podle stupně znečištění lze čisticí roztok po přidání dalšího rozpouštědla použít i na další nádrže. K odstranění zbytkové alkality doporučujeme následně opláchnout pasivačním prostředkem S. Pozor: Rozpouštědlo vinného kamene před použitím dobře rozpustíte ve studené vodě! Po použití důkladně opláchněte pitnou vodou k odstranění zbytků!	
Snášlivost materiálu	PVDF, PP, PE, PVC, ušlechtilá ocel, ocel, šedá litina, sklo Pozor: Rozpouštědlo vinného kamene P nelze používat pro dřevěné sudy nebo materiály jako jsou hliník a jeho slitiny, ani pro pozinkované materiály. Kromě toho nelze zcela vyloučit nesnášlivost na další materiály. Proto před použitím proveďte zkoušku na neškodném místě.	

Stanovení koncentrace	Viz titrační předpis		
Fyzikální a chemické vlastnosti			
Vzhled/barva	Bílá		
Podoba	Prášek		
Zápach	Bez zápachu		
Pěnění (za aplikačních podmínek)	Nepění		
Fosfáty	Žádné		
Hustota (20°C) g/l	1050,0 – 1200,0		
Koncentrace	1% v destil. H ₂ O	3% v destil. H ₂ O	5% v destil. H ₂ O
Hodnota pH (1%, 20°C)	12,5 – 13,1	odpadá	odpadá
Vodivost (1%, 20°C) mS/cm	46,0 – 52,0	120,0 – 135,0	195,0 – 215,0
Hodnota p (ml)	12,0 ± 1,0 (1 % při první dávce 5 ml)		
Hodnota m (ml)	Odpadá		
Stálost při uskladnění	+ 20°C do + 40°C		
Upozornění na biocidy	Odpadá		
Nebezpečné látky a výstražné symboly	Hydroxid sodný Dinatriumtrioxosilicat-Pentahydrat  NEBEZPEČÍ		
Zvláštní pokyny	Nádobu vždy zavírejte originálním uzávěrem a skladujte v chladu a bez oslunění. Nikdy nevrátte již odebraný produkt zpět do nádoby. Před použití bezpodmínečně dodržujte pokyny našeho bezpečnostního listu!		
Odstranění odpadu	Odstranění odpadu proveďte dle úředních podmínek, příp. se obraťte na výrobce.		

Pokyny o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování viz naše bezpečnostní listy a náš provozní návod. Údaje tohoto technického listu odpovídají dnešnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností. Tyto údaje nepředstavují žádnou záruku, ale jsou nezávazné a jen orientační. Nezaručují určité vlastnosti ani vhodnost pro určitý účel použití. Z důvodu velkého množství možných vlivů při používání našich výrobků tyto údaje nezpracovávají. uživatelé povinnosti provedení zkoušek a příslušných preventivních opatření. Případně existující ochranná práva je nutno zohlednit.