

LALLEMAND	LALLZYME®	C-MAX
APLIKACE	Čiření moštů a vín.	
POPIS	Granulovaná pektináza s vysokou koncentrací. Specifické pro extrémní podmínky číření (vysoký obsah pektinu, nízká teplota). Původ: <i>Aspergillus niger</i> .	



AKTIVITA A ZPŮSOB ÚČINKU

LALLZYME C-MAX obsahuje v optimálním množství tři hlavní pektinázy, které se podílejí na hydrolýze pektinu: polygalakturonázu, pektinesterázu a pektinlyázu.


LALLZYME C-MAX je velmi specifický díky vysokému obsahu endo působících enzymů (pektin lyázy a endo polygalakturonázy), které výrobku propůjčují jedinečné vlastnosti:

- rychlý pokles viskozity
- účinný i při nízkých teplotách (min. 5 °C)
- zlepšuje usazování sedimentů

LALLZYME C-MAX

Výkonnost

Profil



DÁVKOVÁNÍ

Aplikace	Parametry (teplota/čas)	Doporučené dávkování (g/hL)
Statické čiření šťávy, běžné podmínky	12-20 °C / 3-12 hodin	0.5 g
Statické čiření šťávy, obtížné podmínky	5-12 °C / 3-12 hodin	1-2 g

Enzym zředíte v přiměřeném množství (průměrně 1:100) vody nebo hroznového moštu, aby se rovnoměrně rozdělil do celého množství šťávy nebo

* Přesnější doporučení pro dávkování naleznete v naší příručce LALLZYME CLARIFICATION GUIDELINE.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

LALLZYME C-MAX je k dispozici v 250 g uzavřených plastových nádobkách, dodávaných v 2,5 kg kartonech (10 x 250 g).	Uzavřené nádoby lze skladovat na suchém místě při pokojové teplotě. Datum použitelnosti je uvedeno na spodním štítku nádoby.	Je třeba se vyhnout přímému kontaktu s kůží a prachem. Enzymy mohou způsobit senzibilizaci při vdechování. Další podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu LALLZYME C-MAX (MSDS).
---	--	---

C-MAX

LALLZYME